



/////// Ficha Técnica

Racumin® Pó Profissional



Marca Comercial: Racumin® Pó Profissional

Nome Técnico: Cumatetralil

Grupo Químico: Hidroxicumarinas

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO

Grupo químico

Hidroxicumarinas

Nome comum

Cumatetralil

Antídoto/ Tratamento

Vitamina K1 e tratamento sintomático. Em caso de ingestão, fazer lavagem até 2 horas após a ocorrência de ingestão de quantidades consideráveis, administrar carvão ativado e sulfato de sódio. Dar vitamina K1 hidrossolúvel por via intravenosa. Transfusão de sangue quando os fenômenos forem muito graves. Acompanhar o nível de protrombina até normalização.

Telefone de Emergência Médica

0800 701 0450

Informações Toxicológicas

0800 02 43 334

TeleBayer

0800 017 99 66

COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo

4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin

p.a. Cumatetralil 0,7500% p/p

Benzoato de Denatonium 0,0010%

Inertes

Corante, estabilizante, inertes 99,2498 % p/p

Fórmula Bruta

$C_{19}H_{16}O_3$

Classe

Raticida

Tipo de Formulação

Pó de contato

Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda: DL50 oral, ratazana: aprox. 5000 mg/kg (Bayer); DL50 dérmica, ratazana: > 5000 mg/kg (Bayer)

Indicações de Uso

Racumin® Pó Profissional é um raticida à base de Cumatetralil indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Uso

Aplicar o produto diretamente nos locais com infestações de roedores como tocas, buracos, frestas ou outros esconderijos. Não interferir nas características do local para não alterar as trilhas naturais do roedor. Aplique **Racumin® Pó Profissional** diretamente nos esconderijos de forma a encaixar a saída da embalagem não deixando o produto exposto. Se possível, obstruir as saídas com terra ou outro material de vedação.

Dosagens

Aplicar 50g por toca sem a utilização de um pulverizador.

Renovar sempre que necessário até que não se perceba mais sinais da presença de roedores. Este será o sinal de que os roedores foram controlados.

Importante: Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Recomendações de uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar.
- Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes.
- Durante o manuseio, usar calças compridas, blusa de manga comprida, luvas, proteção ocular e máscara FFP2 e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar.
- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.
- Para descarte de embalagem, observe a legislação Municipal, Estadual e Federal.
- Em caso de acidente, recolha o produto com o auxílio de uma pá limpa, evitando a formação de poeira. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar contaminação do meio ambiente pelas águas residuais. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente.
- Mantenha o produto em lugar seco, fresco e ventilado, ao abrigo de luz solar direta.
- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Reaplicar o produto quando houver indícios de nova infestação.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Orientar que o ponto de iscagem seja observado diariamente pelo adulto morador, impedindo a entrada de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada.
- Uma vez consumido o pó raticida, a limpeza de eventuais resíduos (estimados em cerca de 10 a 20% da isca), deve ser feita com calças compridas, blusa de manga comprida, luvas e máscara FFP2 e colocando em saco plástico devidamente fechado e encaminhado para destinação final.
- Em caso de ingestão não provoque o vômito
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza
- Usar calças compridas, blusa de manga comprida, luvas, proteção ocular e máscara FFP2
- Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes
- Não se deve contaminar os cursos de água
- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.
- Para o descarte de embalagem consulte o fabricante.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0049

N.º C.A.S. do ativo: 5836-29-3

Informações comerciais: tabela

